

Schlesische

Landwirthschaftliche Zeitung.

Organ der Gesamt-Landwirthschaft.

Redigirt von Wilhelm Janke.

Nr. 35.

Neunter Jahrgang. — Verlag von Eduard Trewendt in Breslau.

27. August 1868.

Inhalts-Übersicht.

Erntebericht vom Jahre 1868.
Der Nutzen und die Nutzbarkeit des Kartoffelkrauts. (Schluß.)
Resultate der Einsammlung von Maitäfern während des Flugjahres 1868. (Schluß.)
Das Abblatten der Rüben.
Das Einlegen der Eier.
Provinzialberichte.
Auswärtige Berichte.
Literatur.
Wochentaler.

Erntebericht vom Jahre 1868.

Die nasse Witterung der ersten vier Monate ließ die Befürchtung aufkommen, daß wir wieder einem so geringen Erntejahre entgegengehen würden, wie das vorjährige, doch machte der Mai diese Befürchtung glücklicherweise zu Schanden. Seit Menschengedenken ist der Mai nicht so schön gewesen als in diesem Jahre. Es konnte deshalb die noch rückständige Feldbestellung schnell und gut besorgt werden und alle Saaten gediehen vortreflich. Auch der ganze Juni war trocken und sehr warm und die Aussichten auf eine reiche Ernte befestigten sich immer mehr. Leider wurden dieselben im Juli sehr herabgestimmt, da auch dieser ganze Monat, wenigstens in seinen letzten drei Vierteln, anhaltende Trockenheit und eine in diesem Jahrhundert noch nicht erlebte continuirliche Hitze brachte. Namentlich alle Sommerfaaten litten durch diese Trockenheit und Hitze sehr erheblich, während das Futter auf den Feldern und Wiesen ganz versengte.

Während man nach Ende April glaubte, daß die diesjährige Ernte sehr spät fallen würde, ist sie in Folge der dreimonatlichen Trockenheit und Hitze 2 bis 3 Wochen früher als gewöhnlich, überhaupt so frühzeitig eingetreten, wie sich kaum die ältesten Leute zu erinnern wissen. Ein Vortheil war dieses freilich nicht, weil fast alle Fruchtarten mehr oder weniger nothwendig wurden, worunter sowohl der quantitative, als auch und ganz besonders der qualitative Ertrag litt. Dazu kam noch, daß die meisten Fruchtarten fast gleichzeitig reiften, und daß es in Folge dessen an Arbeitskräften zur Beschickung der Ernte mangelte. Auch daraus sind Verluste sowohl in Quantität als in Qualität der Halmfrüchte entstanden, besonders auf solchen größeren Landgütern, die sich zur Aberntung der Halmfrüchte immer noch der Senfe bedienen. Noch niemals hat sich die große Bedeutung der Mähmaschinen so eclatant herausgestellt, als in diesem Jahre, obgleich dieselben namentlich in der Qualität ihrer Leistungen noch Manches zu wünschen übrig lassen.

Daß Trockenheit dem Ertrage der Körnerfrüchte weit weniger nachtheilig ist als Nässe, hat auch dieses Jahr wieder gelehrt. Trotz der dreimonatlichen Trockenheit und intensiven Hitze hat man in diesem Jahre weit reicher geerntet als im vorigen Jahre. Die verschiedenen Länder bedingen aber hierooon einen großen Unterschied. Während im Süden der Ertrag an Körnern und Stroh kaum etwas zu wünschen übrig läßt, ist er im Norden weit weniger befriedigend gewesen.

Anlangend die verschiedenen Fruchtarten, so haben im Allgemeinen Delgewächse weit besser gelohnt als in einer Reihe der vorhergegangenen Jahre.

Wintergetreide war ungleich ergiebiger als Sommergetreide, und von jenem zeichnet sich wieder der Weizen entschieden vor dem Roggen aus, da dieser ziemlich dünn stand.

Sommergetreide hat von der anhaltenden Hitze und Trockenheit sehr gelitten; insbesondere war es so kurz geblieben, daß sich der Ausfall im Stroh als sehr bedeutend herausstellte, doch genügt auch der Körnerertrag bei Weitem nicht.

Mit den Hülsengewächsen war es nicht viel besser als mit dem Sommergetreide; auch sie haben durch die abnorme Witterung gelitten, obgleich nicht in dem Grade, wie Gerste und Hafer, weil sie die Bodenfeuchtigkeit länger bewahrten.

Den ungünstigsten Einfluß äußerte die lange Trockenheit und Hitze auf die Futterkräuter und Futtergräser. Während der erste Wuchs ziemlich befriedigte, vertrockneten die Pflanzen des zweiten Wuchses fast vollständig, so daß von einer zweiten Ernte nicht die Rede war; dadurch ist nicht nur der Futterertrag sehr bedeutend geschmälert worden, sondern man hat auch sehr wenig Kleesamen geerntet.

Wie mit dem Feldfutter, so verhält es sich auch mit dem Wiesenfutter. Während die Heuernte in Quantität, noch mehr aber in Qualität zufriedenstellte und ebenso wie die Getreideernte auf das Glückliche verlief, ist an eine Grummeternte auf allen nicht wasserbaren Wiesen nicht zu denken, da der Boden fast vollständig ausgetrocknet ist. In einem Jahre wie in diesem wird man jedenfalls den Segen vollkommen zu würdigen gelernt haben, welcher im Gefolge von Bewässerungsanlagen ist.

Die Kartoffeln, welche noch im Juni so vielversprechend waren, werden in Folge gehinderten Wachstums der Knollen nur einen sehr mittelmäßigen Ertrag geben, sich dagegen in qualitativer Hinsicht auszeichnen. Die trockene, heiße Witterung hat bezüglich dieser wichtigen Fruchtart wenigstens das Gute gehabt, daß sie die Krankheit hintanhält.

Mit den Rüben und dem Kopfschl verhält es sich fast ebenso wie mit den Kartoffeln; auch auf jene hat die Witterung ziemlich ungünstig eingewirkt, so daß der quantitative Ertrag weit hinter einer Durchschnittsernte zurückbleiben wird. Was insbesondere die Zucker-

rüben anlangt, so hat die Hitze den Pflanzungen in Schlesien, Pommern und dem Oderbruche den größten Nachtheil zugefügt. In der Provinz Sachsen, Anhalt, Braunschweig wird der Ertrag etwas reicher sein, aber hinter einer Durchschnittsernte doch noch sehr zurückbleiben, da bereits Ende Juli die Blätter vertrocknet waren. Günstiger gestalten sich die Ernteergebnisse in Süddeutschland. In Frankreich erntet man nur da gut, wo rechtzeitig Regen gefallen ist, sonst schlecht. In Rußland wird man kaum eine halbe Ernte machen, ebenso in Oesterreich und Ungarn.

Von dem Wein sind die Frühaaten fast ganz mißrathen, aber auch die Spätsaaten sehr zurückgeblieben; ganz besonders bezieht sich dieses auf die Höhe der Reinstengel.

Anlangend den Hopfen, so war die ausgiebige Winter- und Frühjahrseuchtigkeit und die seltene Wärme im Mai der Entwicklung der Rebe in dem ersten Stadium ihres Wachstums sehr förderlich; die dann folgende übergroße Hitze und Trockenheit beeinträchtigte aber das gleichförmige Wachsthum bedeutend. Schon Ende Juli konnte fast überall mit der Ernte des Frühhopfens begonnen werden. Im Ganzen ist der quantitative Ertrag nicht höher als zu einer halben Ernte zu veranschlagen, dagegen übertrifft die Qualität die der besten früheren Jahrgänge. Trotz des geringen Ertrages werden aber die Hopfenpreise nicht sehr anziehen, da auf dem Continent noch ca. 120,000 Centner ältere Waare lagern.

Sehr reich war fast überall die Ernte an Obst, ganz besonders an Kirichen, Birnen, Zwetschen und Wallnüssen, wodurch der Vorrath an gesunden Nahrungsmitteln nicht unbedeutlich vermehrt wird.

Noch ungleich reicher als die Ernte des Baumobstes gestaltet sich überall der Ertrag des Weinstocks. Die Reben sind mit Trauben förmlich überladen; was aber besonders in die Wagschale fällt, ist die ausgezeichnete Qualität des diesjährigen Weins, wie man sie seit 1811 nicht wieder erlebt hat.

Gemüse dagegen hatten von der Witterung sehr zu leiden; fast alle Arten kamen nicht zur vollkommenen Entwicklung, vertrockneten theilweise sogar. Nur die Gurken machten davon eine Ausnahme; dieselben kamen in so großen Massen zum Verkauf, daß sich ihr Preis sehr drückte.

Dieser allgemeinen Uebersicht über die diesjährige Ernte lasse ich nun die Ernteergebnisse der verschiedenen Länder nach den zuverlässigsten Quellen folgen.

Preußen. Nach officiellen von dem „Staats-Anzeiger“ publicirten Nachrichten hat sich die Getreide- und Kartoffelernte in den 36 Regierungsbezirken folgendermaßen gestellt: Königsberg Winter- und Sommergetreide mittel, Kartoffeln mittel; Gumbinnen Winter- und Sommergetreide schlecht, Kartoffeln mittel; Danzig Weizen gut, Roggen, Gerste, Hafer, Kartoffeln mittel; Marienwerder Weizen gut, Roggen mittel bis gut, Gerste, Hafer, Kartoffeln mittel; Potsdam Weizen und Roggen mittel bis gut, Gerste und Hafer mittel, Kartoffeln mittel bis gut; Frankfurt a. d. O. Weizen mittel bis gut, Roggen mittel, Gerste und Hafer schlecht, Kartoffeln mittel; Stettin Weizen gut, Roggen, Gerste Hafer, Kartoffeln mittel; Cöslin wie Stettin; Stralsund Weizen und Roggen mittel, Gerste schlecht, Hafer und Kartoffeln mittel; Breslau Weizen mittel bis gut, Roggen, Gerste, Hafer, Kartoffeln mittel; Liegnitz und Oppeln wie Breslau; Posen Weizen und Roggen mittel bis gut, Gerste und Hafer schlecht, Kartoffeln mittel; Bromberg Weizen mittel, Roggen gut, Gerste mittel, Hafer schlecht, Kartoffeln schlecht; Magdeburg Weizen mittel bis gut, Roggen mittel, Gerste mittel bis gut, Hafer mittel, Kartoffeln mittel; Merseburg Weizen und Roggen mittel bis gut, Gerste und Hafer mittel, Kartoffeln auf dem rechten Elbufer sehr mittelmäßig, auf dem linken reichlich; Erfurt Weizen mittel bis gut, Roggen, Gerste, Hafer, Kartoffeln mittel; Münster Weizen und Roggen mittel bis gut, Gerste und Hafer schlecht, Kartoffeln gut; Minden Weizen und Roggen mittel bis gut, Gerste und Hafer schlecht, Kartoffeln mittel; Arnberg Weizen und Roggen gut, Gerste mittel bis gut, Hafer mittel, Kartoffeln gut; Rön Weizen, Roggen, Gerste gut, Hafer mittel, Kartoffeln gut; Düsseldorf Weizen, Roggen, Gerste gut, Hafer schlecht, Kartoffeln gut; Coblenz Weizen, Roggen, Gerste gut, Hafer mittel, Kartoffeln gut; Aachen und Trier wie Coblenz; Hohenzollern in allen Fruchtarten gut; Hannover Weizen mittel bis gut, Roggen gut, Gerste mittel, Hafer schlecht, Kartoffeln gut; Hildesheim Weizen und Roggen gut, Gerste mittel, Hafer schlecht, Kartoffeln mittel; Lüneburg Weizen gut, Roggen mittel, Gerste und Hafer schlecht; Kartoffeln mittel; Stade alle Getreidearten mittel bis gut, Kartoffeln mittel; Osnabrück Weizen gut, Roggen mittel, Hafer schlecht, Kartoffeln mittel; Aurich Weizen, Roggen, Gerste gut, Hafer und Kartoffeln mittel; Rassel Weizen und Roggen gut, Gerste, Hafer, Kartoffeln mittel; Wiesbaden Weizen gut, Roggen mittel, Gerste und Hafer gut, Kartoffeln mittel bis gut; Schleswig Weizen mittel bis gut, Roggen mittel, Gerste und Hafer schlecht, Kartoffeln mittel bis gut; Kiel Weizen mittel bis gut, Roggen mittel, Gerste und Hafer schlecht, Kartoffeln mittel. Der Ertrag an Hülsenfrüchten war im ganzen Lande mittel bis schlecht. Ueberall ergibt sich ein mehr oder minder großer Strohausfall. Die Qualität der Körner wird überall gerühmt. Die Futterernte war nur im ersten Schnitt ergiebig; der zweite Wuchs fiel, mit Ausnahme der Gebirgsgegenden und einiger Districte, wo sich öfter feuchte Niederschläge ereigneten, ganz aus. Die Nübenenernte wird noch weit unter mittelmäßig sein; dagegen werden sich die Zuckerrüben durch

eine gute Qualität auszeichnen. In den Hopfenbau-Geenden hat der Hopfen nur eine schwache halbe Ernte geliefert. Dagegen war die Obsternte gut und der Wein wird in Quantität und Qualität ausgezeichnet sein. Nach Vorstehendem wird, mit Ausnahme des Regierungsbezirks Gumbinnen, ein Mangel an Getreide und Kartoffeln nicht eintreten; um so empfindlicher wird sich dagegen der Mangel an Viehfutter erweisen; da die Salamität der Futterernte sich nicht bloß auf Preußen beschränkt, sondern fast auf ganz Europa erstreckt, so wird eine ansehnliche Reduction des Viehstandes nicht ausbleiben.

Sachsen. Im Allgemeinen ist die Ernte in dem gebirgigen Theile des Landes besser ausgefallen als in den ebenen, und dort kennt man auch die Futterernte nicht in dem Maße wie hier. Im Durchschnitt des ganzen Landes kann man den Ertrag folgendermaßen schätzen: Weizen gut, Roggen mittel, Gerste unter mittel, Hafer mittel bis schlecht, Hülsenfrüchte unter mittel. Kartoffeln werden klein bleiben, aber von guter Qualität sein, Ertrag im Ganzen mittel. Rüben, an denen schon Anfang August die Blätter vertrocknet waren, werden einen noch geringeren Ertrag liefern als die Kartoffeln. Sehr beträchtlich ist im ganzen Lande der Strohausfall, noch ungleich größer aber der Mangel an Wiesenfutter und Futterkräutern. Der Ertrag an Obst war ein reicher; glänzend wird sich die Weinernte sowohl in Quantität als Qualität gestalten.

Thüringen. Während man in den Gebirgsgegenden fast in jeder Beziehung mit dem Ernteergebnisse zufrieden sein kann, ist das Verhältniß in den Thal- und ebenen Gegenden ein ganz anderes. Hier war die beste Frucht der Roggen, doch hat derselbe in Quantität nur eine schwache Mittelernte geliefert; die Qualität ist als gut zu bezeichnen. Weizen, wenn auch etwas stroharm, hätte an Körnern eine gute Mittelernte gegeben, wenn er nicht zu früh gereift wäre, was namentlich auf leichterem Boden großen Schaden verursacht hat. Die Gerstenernte war seit mehreren Jahrzehnten die geringste; auch der Hafer und die Hülsenfrüchte haben durchschnittlich nur einen geringen Ertrag gegeben. Futter ist so wenig gebaut worden, wie seit vielen Jahren nicht, und Kartoffeln, Rüben, Kraut haben durch die anhaltende Hitze und Dürre so gelitten, daß sie nur einen höchst mittelmäßigen Ertrag in Aussicht stellen; dagegen befriedigen sehr Gurken, Baumobst und Wein.

Mecklenburg. Im Ganzen lauten die Nachrichten ungenügend. Wirklich gut war die Ernte nur in einigen Gegenden mit sehr mildem Boden und in wenigen Strichen, wo rechtzeitig Gewitterregen eintraten. Am geringsten hat man auf leichtem und ganz schwerem Boden geerntet. Nimmt man den zehnjährigen Durchschnitt zu 100 an, so gestaltet sich das Ernteergebnis im ganzen Lande folgendermaßen: Raps und Rüben 100, Weizen an Korn 85, Stroh 75, Roggen an Korn 85, Stroh 75, Gerste an Korn 75, Stroh 70, Hafer an Korn und Stroh 70, Erbsen an Korn und Stroh 90, Wicken an Korn 70, Stroh 60, Kartoffeln 80 bis 90, Rüben 70. Weizen und Roggen sind in Qualität sehr gut, Gerste und Hafer weniger, die Erbsen zeigen viel Wurmfraß. Die erste Futterernte hat mehr als einen Durchschnittsertrag geliefert, während die Nachmahd kaum zu rechnen ist.

Oldenburg. Wintergetreide in Korn und Stroh mittelmäßig, Sommergetreide und Hülsenfrüchte gering. Futtermangel sehr groß.

Anhalt. Die Getreideernte kann im Allgemeinen als eine befriedigende bezeichnet werden. Weizen hat befriedigt, Roggen hat in Schoden weniger gegeben, doch ist der Körnerertrag ein reichlicher; Gerste und Hafer sind zufriedenstellend. Kartoffeln werden nur einen mitteln Ertrag geben. Die Zuckerrübe steht nur auf gutem Boden gut, während sie auf geringerem Boden sehr ungünstige Aussichten bietet. Obst, namentlich Aepfel und Zwetschen, hat in Folge der heißen Sommerwitterung viel gelitten, noch mehr das Futter, welches zur Ernährung der Viehstände bei Weitem nicht ausreicht.

Braunschweig. Die Weizen- und Haferernte war gut, die Roggenernte mittelmäßig, die Gersten- und Haferernte in Körnern gut mittel, im Stroh gering. Kartoffeln werden nur in der Qualität genügen, in der Quantität stellen sie nur einen Mittelertrag in Aussicht. Zuckerrüben wie in Anhalt. An Futter stellt sich auch im Herzogthum Braunschweig großer Mangel heraus.

Waldeck und Lippe. Weizen und Roggen haben einen guten Ertrag gegeben; dagegen hat die Dürre dem Sommergetreide und dem Gemüse sehr geschadet, so daß man die Ernte von jenem nur zu einer Dreiviertel-ernte im Korn, zu einer halben im Stroh annehmen kann. An Futter großer Mangel.

Bayern. Weizen und Roggen in der Schüttung sehr ergiebig, in der Qualität ausgezeichnet, in Franken beide mittelgut. Sommergetreide hat auf leichtem Boden sehr gelitten, ebenso Kartoffeln, Rüben, Klee und Wiesen. Im Durchschnitt des ganzen Landes kann man die Getreideernte, was die Körner anlangt, als eine gutmittel, die Kartoffelernte als eine mittelmäßige schätzen. Baumobst, noch mehr der Wein, ausgezeichnet. Die meisten Hopfengegenden haben in Qualität und Quantität ausgezeichnet geerntet; nur Heerbrud ist sehr zurückgeblieben.

Württemberg. Der Ernteertrag war seit 10 bis 15 Jahren nicht so reich; besonders Dinkel und Gerste haben in Quantität und Qualität die zufriedenstellendsten Erträge geliefert; weniger läßt sich dieses vom Hafer sagen, der namentlich im Stroh ziemlich zurückgeblieben, doch vollkörnig ist. Kartoffeln versprechen einen gutmitteln, Zuckerrüben einen guten Ertrag. Hopfen befriedigt sowohl in Quan-

tität als in Qualität. Baumobst wird sehr reichlich gewonnen. Die Weinernte bietet so glänzende Aussichten wie seit 1811 nicht.

Baden. Die Getreideernte war sehr befriedigend; auch die Kartoffeln gewähren günstige Aussichten. Hopfen hat in Quantität einen guten Mittelertrag gegeben; die Qualität ist so ausgezeichnet wie seit vielen Jahren nicht; dagegen klagt man sehr über den Tabak. In Folge der anhaltenden Hitze und Trockenheit wird man nur einen schweren, fetten Tabak erzielen, der sich wenig oder gar nicht zur Cigarrenfabrikation eignen wird. Während die Heuernte gut war, fällt die Grummeternte in den Thal- und ebenen Gegenden unter mittelmäßig aus und hier wird man mit Futtermangel zu kämpfen haben. Obst sehr reichlich, Wein in Fülle.

Hessen. Weizen und Roggen haben einen guten Korn- und Strohertrag gegeben; dagegen ist die Gerste größtentheils nicht zur vollen Entwicklung gekommen; besser war der Hafer. Kartoffeln versprechen einen zufriedenstellenden Ertrag. Obst giebt es in Fülle, Wein in Ueberschuß.

Oesterreich. In Böhmen hat der Winterweizen im Durchschnitt eine gute Zweidrittel-ernte gegeben, während Sommerweizen sowohl in Korn als in Stroh ein weit geringeres Erträgnis geliefert hat. Roggen hatte stellenweise durch die anhaltende Dürre gelitten und ist in Folge dessen hier und da nothreis geworden. Im Ganzen bewegt sich der Ertrag desselben zwischen einer halben und Zweidrittel-ernte. Gerste hatte unter dem Getreide am meisten gelitten und der Ertrag schwankt zwischen einer halben und Zweidrittel-ernte. Hafer $\frac{1}{2}$ bis $\frac{2}{3}$ einer gewöhnlichen Ernte. Wiesenheu und Klee haben im ersten Hieb einen guten Ertrag geliefert, wogegen der zweite Wuchs ein sehr geringfügiger ist. Hülsenfrüchte waren von Insekten stark mitgenommen. Kartoffeln und Zuckerrüben stellen einen guten Ertrag in Aussicht. Die Obst- und Weinlese wird eine reiche sein. Wein und Hafer sind nicht gut gerathen. Der Hopfen-ertrag war in Quantität sehr verschieden (Saazer Stadthopfen eine gute Drittel-ernte, Bezirk- und Kreis-Hopfen eine halbe Ernte, Aufse kaum eine halbe Ernte), in Qualität ausgezeichnet. — In Mähren haben zwar einzelne Gegenden durch die anhaltende Dürre und durch Hagelschäden gelitten, doch hat man im Allgemeinen eine gute Ernte gemacht. — In Schlesien war der Ertrag an Weizen gut, im Roggen nur mittelmäßig, im Sommergetreide gut in Körnern, mittelmäßig im Stroh. Kartoffeln versprechen eine gute, Rüben eine mittelmäßige Ernte, während Weizen einen schlechten Ertrag gegeben hat. — In Oberösterreich ist das Wintergetreide gut gerathen, dagegen hat Sommergetreide einen nur sehr mittelmäßigen Ertrag geliefert. Der Heu- und Obst-ertrag war reich, wogegen der zweite Wuchs der Wiesen und Kleefelder ganz verbrannt ist. Der Hopfen hat nur $\frac{1}{2}$ einer gewöhnlichen Ernte gegeben. — In Niederösterreich hat Wintergetreide eine reichliche Mittelernte, Sommerweizen und Hafer weniger als eine Mittelernte, Gerste eine einfache Mittelernte geliefert. Kartoffeln und Zuckerrüben versprechen guten Ertrag. Heu war in Quantität und Qualität sehr gut, Grummet sehr wenig. Obst viel und gut. — In Salzburg, und zwar im Flachlande, war die Heu-, Getreide- und Obst-ernte gut, im Gebirge dagegen unter der Mittelmäßigkeit. — In der Steiermark, und zwar im mittleren und unteren Theile derselben, hat man in Getreide gut geerntet; die obere Steiermark hat noch etwas mehr als einen Mittelertrag geliefert. Auch Kartoffeln versprechen eine gute Ernte. Hopfen befriedigt sowohl in Quantität als in Qualität. Dasselbe gilt von dem Feld- und Wiesenfutter. — In Kärnten war die Getreideernte an sehr vielen Orten nur eine mittelmäßige, wogegen die Bezirke Oberndorf und Gurk gut, Arnoldstein, Bleiburg, Oberstein, Feldkirchen, Friesach, Kappel, St. Veit, Winklern und Wolfsberg sehr gut geerntet haben. — In Krain hat man sehr gut geerntet, nur der Karst eine Ausnahme gemacht. — In Galizien war die Weizen-ernte in Quantität und Qualität gut, die Roggen- und Gersten-ernte schlecht, die Hafer-ernte sehr mittelmäßig. Im Allgemeinen kann man die diesjährige Ernte als eine Mittelernte schätzen. — In Tirol und Vorarlberg hat man im Allgemeinen zur Zufriedenheit geerntet. In Südtirol war auch die Seiden-ernte eine sehr günstige und die Weinernte wird auf das Reichste ausfallen. — In der Bukowina hat man nur mittelmäßig geerntet mit Ausnahme von Mais und Kartoffeln, die einen guten Ertrag gegeben haben. — In Dalmatien war der Ertrag an Weizen, Roggen, Gerste und Halbfucht gut, an Hülsenfrüchten weniger gut. Mais, Hirse und Mooshirse versprechen eine reiche, Kartoffeln nur eine mittelmäßige Ernte. Der Stand der Weinrebe und des Delbaums ist sehr schön. — Ungarn und Nebenländer. Nach einer Mittheilung des ungarischen Handelsministeriums hat sich die Ernte im Jahre 1868 verglichen mit der des Jahres 1867 folgendermaßen gestaltet:

In Winterfrüchten:			In Sommerfrüchten:		
1867, 1868.			1867, 1868.		
In 3	2 Comit.	sehr gut.	In 1	2 Comit.	sehr gut.
16	13	gut.	24	6	gut.
9	12	gut mittel.	7	11	gut mittel.
11	11	mittel.	10	15	mittel.
3	2	gering.	1	4	gering.
1	3	schlecht.	—	5	schlecht.

Die Ernte ist im Szathmarer, Szolnoker, Bihar, Bekser, Baranyaer Comitats und in Slovenien besser; im Preßburger, Neutraer, Trentschiner, Borjober, Zipser, Albaner, Sáros, Zempliner, Odenburger, Raaber, Zalaer, Eisenburger, Veszprimer, Somogger, Kraszer Comitats und auf dem Haiducken-District geringer als im Vorjahre. Es ergibt sich für das heutige Jahr durchschnittlich für Wintergetreide eine mittelmäßige, für Sommergetreide dagegen nur eine mittlere Ernte. Trotzdem die Maisernte eine sehr gute werden wird, stellt sich doch die Ernte dieses Jahres bedeutend ungünstiger, als die vorjährige, um so mehr, als in mehreren Comitaten der Weizen brandig und in anderen durch die übermäßige Hitze in der Entwicklungsperiode zusammengeschrunpelt ist. Was insbesondere Süd- und Ungarn anbelangt, so hat das Hauptproduct, der Weizen, in Quantität eine gute Durchschnittsernte gegeben; die Qualität ist sehr verschieden; die beste Qualität liefert unstreitig die Theißgegend mit 87 bis 88 Wiener Pfund Effectivgewicht per niedersöther. Morgen, schwächere die Marosgegend, durchschnittlich 86 Pfund, die schwächste das Banat, wo das Qualitätsgewicht an der Nordgrenze zwischen 86 und 85 Pfund schwankt, während der südliche und südöstliche Theil ganz schwache Qualitäten von 84 Pfund abwärts hat. Von Weizen konnte etwa das gleiche Quantum wie im Jahre 1867 zur Ausfuhr gelangen, wenn nicht ein fast gänzlicher Ausverkauf der alten Waare stattgefunden hätte, der inländische Consum von Jahr zu Jahr größer würde und die sich hebende Mühlen-Industrie bedeutende Quantitäten absorbierte. In Roggen war die Ernte gut, mitunter sehr gut, weshalb bedeutende Quantitäten zur Ausfuhr verfügbar sind, wenn sich die Preise lohnend gestalten; in anderen Fälle wird der

Roggen im Inlande zu industriellen Zwecken verwendet werden. In Gerste war der Ertrag mittelmäßig und die Qualität ist nicht so befriedigend, wie im Vorjahre, doch giebt es auch hier häufig vollstörnige Malzgerste. Qualitätsgewicht 60 bis 70 Pfund. Hafer hat eine gute Mittelernte gegeben, doch ist die Waare in Folge des öfteren Regens etwas gebräunt, sonst ist die Qualität gut; Gewicht 46 bis 47 Pfund. — In Croatien war die Weizen- und Roggen-ernte gering, die Gersten-ernte in Quantität und Qualität befriedigend; die Maisernte wird sich sehr reich gestalten und in Kartoffeln erwartet man einen noch höheren Ertrag als im vorigen Jahre.

Frankreich. Im nördlichen und mittleren Frankreich ist die Ernte besser ausgefallen, als im südlichen. Im Durchschnitt ist der Ertrag ein mittelmäßiger. Was die verschiedenen Fruchtarten anlangt, so hat Weizen eine Durchschnittsernte geliefert, ist aber vielfach grau und bläsig; Roggen und Gerste lassen weder in Quantität, noch in Qualität etwas zu wünschen übrig; dagegen war die Hafer-ernte mangelhaft. Stroh ist in geringer Menge gewonnen worden, Grummet fast gar kein. Der Wein bietet Aussicht auf die reichste Ernte; dagegen haben Kartoffeln und Rüben demnach von der Dürre gelitten, daß sich der Ertrag dieser Früchte noch unter mittel stellen wird. Wein steht mittelmäßig, Hafer sehr schön, Tabak schlecht. Der Hopfen hat im Elsch fast etwa eine halbe Ernte geliefert.

England. In Weizen hat man entschieden reicher geerntet als im vor. Jahre; auch steht die Qualität des diesjährigen, auf schwerem Boden gewachsen Weizens entschieden höher als diejenige des vorjährigen Products. Das Gewicht schwankt zwischen 62 und 66 Pfund per Bushel. Nur der im leichten, kessigen Boden gewachsene Weizen hat von der anhaltenden Dürre gelitten, ist zu früh gereift und deshalb etwas eingeschrumpft. Die Gerste hat in Quantität einen Mittelertrag bei guter Qualität geliefert, während Hafer unter einem Durchschnittsertrag steht; dasselbe gilt auch von den Bohnen und Erbsen. Der Strohertrag war gering; da auch Wiesen, Weiden und Futterfelder vollständig ausgebrannt sind und die Kartoffeln- und Turnips-ernte sehr gering ausfallen wird, so eröffnen sich für die Viehzucht sehr ungünstige Aussichten. Die Obst-ernte ist eine leidlich gute. Hopfen ist durch die andauernde Hitze und Dürre und durch das Auftreten der roten Spinne sehr geschädigt worden und hat nicht mehr als einen Mittelertrag ergeben, doch ist die Qualität sehr gut. Das Vorstehende gilt von England. In Schottland war die Weizen-, Gerste- und Hafer-ernte besser als in England; Kartoffeln sind theilweise misrathen. In Irland war die Weizen-ernte günstig, die Hafer-ernte mittelmäßig; die Kartoffel-ernte wird sich besser gestalten als in England und Schottland.

Rußland. Nach Spanien und dem südlichen Italien hat Rußland in diesem Jahre am geringsten geerntet. Wir stellen in Nachstehendem die Berichte aus den verschiedenen Gouvernements zusammen: Kiew. Die anhaltende Dürre hat Felder und Wiesen verbrannt. Das Sommergetreide hatte wohl Mehren, aber keine Körner. Befarabien. Die Getreide-ernte ist mittelmäßig ausgefallen; Mais wird reich lohnen; nur in einem Kreise ist Alles verbrannt. Don. Jenseits des Flusses hat man eine reiche, diesseits eine gute Mittelernte gemacht. Jenseits und Simbirsk haben sehr gut geerntet. Wilna trostlos. In vielen Gegenden hat man kaum die Ausfaat wieder erhalten, wozu noch kommt, daß kaum ein Viertel der Felder bestellt war. Kowno. In dieser Kornkammer Nordwest-Rußlands ist die Ernte im wahren Sinne des Wortes trostlos. Die misrathenen Wintergetreidebeständen wurden umgepflügt und mit Sommergetreide bepflanzt, doch hat die Dürre Alles versengt. Manche Güter haben von 100 Last Ausfaat nur 10 Last geerntet. Drel. In Wintergetreide war die Ernte gut, in Sommergetreide kaum mittelmäßig. Kurland. Die Ernte kommt einer Misere nahe. Winter- und Sommergetreide und Futter sind von der anhaltenden Dürre fast ganz vernichtet worden. In Livland hat besonders der Norden sehr gering geerntet; etwas besser war der Ertrag namentlich an Wintergetreide im Süden, während auch hier Sommergetreide und Futter sehr ungünstige Resultate geliefert haben. In Esthland ist die Wintergetreide-ernte äußerst spärlich ausgefallen; Sommergetreide und Futter hat die Dürre fast ganz vernichtet. Iwer. Hier war die Ernte gut. Sibirien. Mit Ausnahme von Irbit hat man gut geerntet. Kaukasien. Mit Ausnahme der Lischit-Gegend war die Ernte gut. Astrachan. Ernte der Feldfrüchte zufriedenstellend, dagegen ist das Obst misrathen. In Podolien, Volhynien, Cherson hat die Dürre Alles zu Grunde gerichtet. In Asow'schen, wo mehr Regen gefallen ist, war die Getreide- und Futter-ernte leidlich. In dem arg heimgefügten Finnland, wo die Aussichten noch Anfang Juni sehr erfreulich waren, ist in Folge der anhaltenden Hitze und Dürre Alles zu Grunde gegangen. Jaroslaw. Nahezu eine Misere. In den Asow-provinzen ist der Wein total misrathen. Ukraine. Wintergetreide mittelmäßig; Sommergetreide sehr schlecht. Im südlichen Rußland wird die Zuckerrübe einen mittelmäßigen Ertrag geben. Polen. In Weizen hat man so befriedigend geerntet, sowohl in Quantität als Qualität, wie seit vielen Jahren nicht; dagegen ist die Roggen-ernte sehr gering gewesen. Sommergetreide hat einen Mittelertrag geliefert, mit Ausnahme des leichten Bodens, wo es sehr gelitten hat. Kartoffeln versprechen einen leidlichen Ertrag.

Schweiz. In Feldfrüchten und Heu war die Ernte gut. Obst und Wein in reichlicher Fülle.

Holland. Die Ernte war sowohl in Menge als in Güte ausgezeichnet.

Belgien. In Getreide hat man reich geerntet, dagegen hat Hopfen nur einen schwachen halben Ertrag gegeben und die Zuckerrübe und Kartoffel werden weit unter einer Durchschnittsernte bleiben.

Schweden und Norwegen. Der Roggen hat im Ganzen eine Mittelernte geliefert; die Qualität ist ausgezeichnet, er wiegt etwas über 15 Keszpfund. Sommergetreide hat auf leichtem Boden wegen Regenmangel eine Misere gegeben; auf schwerem Boden war der Ertrag mittelmäßig. Kartoffeln werden ziemlich weit unter dem Durchschnitt bleiben.

Dänemark. Die Weizen-ernte hat sich gut, die Roggen-ernte mittelmäßig gestaltet; die Qualität der Körner beider Fruchtarten ist ausgezeichnet. Sommergetreide hat auf leichtem Boden sehr gelitten; auf schwerem Boden hat es eine mittelmäßige Ernte geliefert. Kartoffeln bleiben klein. An Futter fehlt es sehr.

Rumänien. Die Weizen-ernte war fast ebenso reich, als im vorigen Jahre, doch ist die Qualität etwas minder gut. Das Land kann wieder bedeutende Mengen Weizen ausführen. Gerste und Hafer haben von der Dürre gelitten, doch ist der Ertrag immer noch ein mittelmäßiger. Mais verspricht einen sehr lohnenden Ertrag. Kartoffeln werden eine Mittelernte geben. Der Wein wird überaus reich lohnen.

Türkei. Man ist mit der Ernte in jeder Beziehung sehr zufrieden. Namentlich Bosnien erfreut sich eines Reichthums an Weizen und Mais, der dem vorjährigen kaum nachsteht.

Italien. Getreide, Seide, Del haben einen reichen Ertrag gegeben und der Weinstock verspricht eine überreiche Ernte; nur im Süden hat das anhaltende Regenwetter fast die ganze Ernte zerstört, während in der römischen Campagna die Heuschrecken alle Feldfrüchte vernichtet haben.

Spanien und Portugal. In beiden Ländern ist die Ernte total misrathen, so daß sich eine bedeutende Getreideinfuhr nothwendig macht.

Australien. Nachrichten aus Adelaide zufolge hat die Weizen-ernte 1 Million Bushel weniger gegeben, als im vorigen Jahre.

Amerika. Aus Newyork schrieb man unter dem 3. Juli: „Der allgemeine Eindruck im ganzen Lande war bis zum 25. Juni, daß die Ernte in Winterweizen eine große sei; die Farmer südwärts finden aber, daß die Ernte weit geringer ist, als sie erwarteten. Aus Nordwesten werden Klagen laut über sehr kurze Mehren. In den mittleren, westlichen und südlichen Staaten wird der Ertrag auf lange cultivirt gewesenen Boden allgemein nicht über einen halben Durchschnitt liefern; nur auf neuem Boden wird er größer sein. In den Staaten Ohio, Indiana, Illinois und Kentucky existirt ein Manco in der Fläche, in anderen Staaten ist dagegen ein bedeutendes Plus. Die Verwüstungen des Kornwurms in den mittleren Staaten sind besorgniserregend. In vielen wird der Ertrag nicht 50 pSt. sein, während er in anderen 30 bis 40 und 60 bis 70 pSt. unter dem Durchschnitt sein wird. Weiter südlich ist der durch den Rost zugesagte Schaden bedeutend. Die Qualität des Weizens ist gut, aber in Quantität wird man im Allgemeinen nicht über eine Zweidrittel-ernte hinauskommen.“ Weiter berichtet man unter dem 21. Juli: „In Illinois ist der Weizen leicht und eingeschrumpft bei nur wenig fester Substanz, so daß das Mehl nicht schön werden wird. Dieselbe Klage ertönt aus den Staaten Missouri, St. Louis, Kentucky, Tennessee. In Maryland hat man sowohl in Quantität als Qualität eine gute Durchschnittsernte gemacht. In Newyork, Pennsylvania, Ohio, Michigan und Indiana hat die Ernte mehr oder weniger durch die Dürre gelitten, und obgleich die mit Winterweizen bestellte Fläche in allen Staaten zu 10 bis 15 pSt. größer als im vorigen Jahre geschätzt wird, so ist der diesjährige Ertrag doch nicht größer, als der vorjährige, die Qualität geringer. Aus der ganzen Nordwest-Region, wo man das Plus der Fläche gegen voriges Jahr zu 25 pSt. annimmt, und in Canada, wo die Mehrausfaat sogar 50 pSt. beträgt, hat die Weizen-ernte nichts zu wünschen übrig gelassen. In Californien wird die Weizen-ernte auf das Doppelte des vorigen Jahres geschätzt. Die Exportfähigkeit der neuen Ernte incl. der Ueberschüsse in Oregon mag 15 Mill. Bushels betragen oder ungefähr ein Fünftel der Totalinfuhr von Weizen und Mehl in Großbritannien in einem knappen Jahre. In Roggen hat Maine genug geerntet. Die Mittelstaaten zeigten kaum den gewöhnlichen Stand; Ohio, Illinois, Iowa und Kansas zeigten einen Ausfall bis zu 6 pSt., während man in den anderen Staaten den gewöhnlichen Durchschnittsertrag erreicht hat. In Gerste haben Kentucky, Missouri und Minnesota gut geerntet, die meisten anderen Staaten kaum einen Durchschnittsertrag gewonnen. Hafer und Erbsen sind durch die Hitze verdorben. Mais verspricht, nachdem Regen gefallen ist, einen Ertrag, der um ein Drittel geringer als im vorigen Jahre sein wird. Obst wird nur in geringer Menge gewonnen.“

Im Durchschnitt der ganzen cultivirten Erde kann man annehmen, daß die Weizen-ernte gut, die Roggen-ernte mittelmäßig, die Gersten-ernte unter mittel, die Hafer-ernte und die Hülsenfrüchte-ernte noch geringer als die Gersten-ernte gewesen ist, daß die Maisernte einen Durchschnittsertrag liefert, die Kartoffel-ernte dagegen ziemlich weit hinter einer solchen zurückbleiben wird.

Geringe Ernten haben gemacht und bedürfen deshalb mehr oder weniger bedeutender Einfuhr: die Provinz Preußen, Nordböhmen, Galizien, ein großer Theil Rußlands, namentlich die Ostprovinzen, Schweden und Norwegen, der Süden Italiens, Spanien und Portugal, wohl auch der Süden Frankreichs. Hierzu kommen noch als konstante Consumanten auswärtigen Getreides die Schweiz und England, da beide Länder selbst in den besten Jahren ihren Bedarf an Getreide nicht selbst erbauen.

Reich geerntet haben und können von ihren Ernteproducten mehr oder weniger ausführen: Bayern, Württemberg, Hohenzollern, Baden, Hessen, die Rheinprovinz, Mähren, Ungarn, Rumänien, Bosnien, Amerika, Australien.

Was nun die muthmaßliche Gestaltung der Getreidepreise anlangt, so ist vor Allem darauf hinzuweisen, daß, da die diesjährige Getreide-ernte durchschnittlich eine weit reichere ist, als im vorigen Jahre, weder in Deutschland, noch in England und Frankreich ein so dringender Begehr nach Getreide sein wird, als es im Jahre 1867 war; vielmehr wird in diesem Jahre das Angebot der Getreide ausführenden Länder die Nachfrage der Getreide einführenden Länder überwiegen. Daß dieser Umstand nicht ohne Einfluß auf die Preise sein wird, ist selbstverständlich. Ausschlaggebend für die Gestaltung der Getreide-, namentlich der Weizenpreise, wird insonderheit Amerika sein, doch kann sich dieser Einfluß nicht eher äußern, bis das amerikanische Getreide in den europäischen Häfen ausgeschifft sein wird; darüber vergeht aber noch einige Zeit.

Auf die Gestaltung der Getreidepreise in diesem Herbst und bis zur nächsten Ernte sind aber noch andere Factoren maßgebend, als das Ergebnis der Getreide-ernte. Es kommt nämlich in Betracht, daß es alte Getreidevorräthe nur noch in sehr geringer Menge giebt; daß die Ernte in Speisekartoffeln eine sehr mittelmäßige sein wird; daß auch Futterkartoffeln und Futterrüben weit hinter einer Durchschnittsernte zurückbleiben werden; daß der Strohertrag gering gewesen ist und Wiesen und Futterkräuter im zweiten Wuchs ganz versagt haben. In Folge dessen ist der Futtermangel schon jetzt drückend und wird sich später als noch drückender erweisen. Findet nun auch eine Reduction der Viehflamme statt, so reicht dennoch das disponible Futter an Stroh, Heu, Kartoffeln und Rüben nicht im Entferntesten aus, und da das Deficit nicht allein durch Deckungen gedeckt werden kann, so muß der Viehhalter seine Zuflucht nothwendig zum Getreide nehmen.

Unter Berücksichtigung aller dieser Momente dürfte man sich in der Annahme nicht irren, daß die Weizenpreise, da die Ernte im Weizen gut war und die Hauptproduktionsländer dieser Getreideart einen bedeutenden Ueberschuß zur Ausfuhr haben, von der Zeit an noch mehr sinken werden, wo der amerikanische Weizen auf den europäischen Märkten erscheinen wird; daß sich die Roggenpreise behaupten werden, da die Ernte in Roggen in Deutschland überall nur eine mittelmäßige, in den meisten Gouvernements Rußlands eine schlechte war, Ungarn, Rumänien und Amerika aber nur verhältnismäßig wenig von dieser Waare ausführen; daß sich auch die Gersten- und Haferpreise behaupten werden, da in diesen beiden Getreidearten die Ernte nicht nur in Deutschland, sondern allenthalben sehr viel zu wünschen übrig gelassen hat.

Aerba.

Der Nutzen und die Nützbarkeit des Kartoffelkrauts.

(Schluß.)

Erst wenn das Kraut zu reifen beginnt, ist es den Knollen ganz entbehrlieh, alsdann aber hat es, wie das reife Gras, schon den größeren Theil seiner Nährkraft verloren und dürfte es schwerlich den oben angeführten Nährgehalt bieten, — dagegen dürfte ein Abmähen während und bald nach der Blüthe, gemäß der Ergebnisse des bekannten Abstreifens der Blüthen, wohl der Entwicklung des Volumens und Gewichts nicht nachtheilig, eher förderlich sein, eben aber auch, wie nach dem Angeführten über die Neigungen der Entkrautung, die Trockensubstanz und Qualität in der Regel beeinträchtigen. Hieraus läßt sich die wohl sehr nahe liegende Folgerung ziehen, daß die Entfaltung der Stauden und deren Samenbildung, überhaupt deren vollständige Lebensfähigkeit an sich mit der Entfaltung der Knollen ebenso correspondirt, als das Gedeihen jeder Pflanze mit der Vollkommenheit ihrer Wurzel, und bekanntlich ist auch naturgeschichtlich constatirt, daß bei den Knollengewächsen nicht so wie bei den Zwiebelgewächsen sich der Knollentrieb vermindert, wenn sich der Blüthentrieb vermehrt, vielmehr gerade dann die meisten Knollen zu erwarten sind, wenn sich viele Blüthen zeigen; demnach die zweifache Bildung von Fortpflanzungsmitteln, wenn sie auf der einen Seite gestört wird, zwar auf der anderen mehr oder weniger angeregt, aber eine abnorme und für die Zweckmäßigkeit der Fortpflanzungsmittel, resp. auch für die technische Nützbarkeit der Frucht zweifelhaft werden muß. — Dagegen ist das Abmähen des in seine Reife tretenden Kartoffelkrauts nicht nur meist von keinem wesentlichen Einflusse auf die Vervollkommenheit der Knollen, sondern es ist insofern auch für diese von Vortheil, als bei der Kultur der Kartoffel die Vegetationszeit der Pflanze künstlich und naturwidrig viel weiter ausgedehnt wird, als sie im natürlichen Zustande, in der Heimath der Kartoffel, dauert und die Abklärung der Vegetation demnach nicht nur ein baldigeres, sondern auch ein gleichmäßigeres Reifen der Knollen bewirkt und insbesondere jenes mißliche Ansehen von Nebenknollen bei den bereits ausgewachsenen verhindert. Auch erfordert ja der gebräuchliche Fortgang der Kartoffelernte die vorherige Beseitigung des Krauts und wartet man ohnehin bei dem Beginn der Ernte nicht etwa auf das Trockenwerden derselben, wohl wissend, daß die Kartoffeln schon vor dem Aufhören der Vegetation ihre Vollkommenheit erlangt haben; mag das reife gewordene Kraut aber seine Nährhaftigkeit um ein Drittel oder die Hälfte herabsetzen, so ist sein Werth doch mit 8 bis 10 Ctr. Heuwerth pro Morgen, wie schon dargestellt worden, beträchtlich genug, um beachtet zu werden und würde sich dann immer noch bis 13 Ctr. belaufen.

Wer jedoch die Antipathien kennt, welche die Landwirthe im Allgemeinen gegen ungewohnte Aufgaben, insbesondere aber gegen solche Neuerungen hegen, welche die Bekämpfung einer altgewohnten Meinung bedingen, der wird außer in Zeiten der Futternoth und außer den Fällen ganz besonderer Betriebsamkeit nicht auf Ausnahme des Kartoffelkrauts als Futter rechnen, sondern solche, als einer späteren Zeit vorbehalten, registriren, — und sich einstweilen damit begnügen, wenn die sonstige Nützbarkeit des Materials entsprechend wahrgenommen wird.

Nicht ohne besonderen Sinn bezeichnet der Landwirth gewöhnlich was er füttert als „Futter-Mittel“, was er streut als „Streumaterial“, und wenn wir hier von der Eigenschaft des Kartoffelkrauts als ersteres absehen, müssen wir es wohl auch als letzteres, als bloßes „Material“ für minder wichtigen Zweck ins Auge fassen. Das Futtermittel nährt das Vieh und schafft Dünger, das Streumittel hilft nur dem letzteren Zwecke dienen und muß, wenn ersteres das Quantum seines Futterwerths, außer dem Nutzen als Futter, noch speciell als Düngermaterial verdoppelt, letzteres aber sein Gewicht unmittelbar in die doppelte Düngermenge verwandelt, wohl stets sehr verschiedene Werthe in dieser und in jener Eigenschaft haben; je nachdem der Futterwerth, der sich zum Düngermittel etwa wie 8 zu 1 verhält, ein größerer oder geringerer ist. Man bringt aber hierbei die der Wissenschaft wie der Praxis gar wohl bekannte Verschiedenheit des Streumaterialwerths nicht mit in Rechnung und kann doch schon jener Unterschied sehr bedeutend modificirt werden, wenn ein Stoff als Futter wenig, als Streu verhältnißmäßig viel werth ist, wie z. B. Roggenstroh bei 25 pCt. seines Gewichts an Heuwerth sich auf die Hälfte seines Gewichts an Düngermittel über den reinen Futtergenutzen stellt, Heu bei dem vierfachen Futtergenutzen auf das Doppelte, während jenes als Streumaterial dem Heu gleich gerechnet, bereits als solches das Doppelte seines Gewichts, das Heu aber eben auch nur so viel gewährt.

Nach den angeführten Rechnungsformen würde sich das Kartoffelkraut als Heu bei 50 pCt. Heuwerth zu dem als Streumaterial wie 5 zu 2 im Werthe verhalten; sehr in Frage aber kommt der wirkliche Streuwerth bei einem so bedeutenden Mineralgehalt. — Vellebt als Streumaterial ist das Kartoffelkraut schon seines concentrirten Volumens wegen, welches die Aufnahme von Flüssigkeit erzwungen und an sich unbequem ist, nicht; — außerdem ist der Holzfaserreichtum und im gewissen Maße auch der starke Mineraliengehalt der Lösung der Stoffe nicht günstig; daher denn auch, wie der Ackerwirth stets mißfällig bemerkt, dieses Streumittel sich meist auch nach längerer Zeit im Dünger wie im Acker unverwest vorfindet; tritt aber die Auflösung vollständiger ein, wobei dann theilweise die Mineralien thätig mitwirken, so vollzieht sie sich auch in rascher Folge. Man nimmt demnach das Kartoffelkraut gern zur Einstreue in Jauchegruben und vor und in die Schweinefäße, auch auf die Schafstriebe der Gehöfte, wo die spitzen Klauen der Schafe seine Auflösung mechanisch befördern, jedoch auf die Wirksamkeit des von ihm gewonnenen Düngers giebt man nicht viel, namentlich hält man diesen, auch wenn er nicht aus den Schwarviehfäßen gewonnen wurde, für nicht erwärmend, also für nicht geeignet auf kalte Gründe; — zum Beweise der richtigen Beobachtung der Praxis gar nicht mit Unrecht. Zwar enthält das Kartoffelkraut getrocknet, wo es allerdings statt jener 12,5 pCt. Mineralien sehr oft noch nicht 10 pCt. Nische gewährt, hauptsächlich Kalk, Kalk, Phosphorsäure und Magnesia, nächst diesen Kieselsäure und andere Mineralstoffe, wonach eben nicht auf Herabsetzung der Temperatur der aufgenommenen Dungsstoffe zu schließen wäre; aber die große Menge Feuchtigkeit, welche es befeuchtet, seiner Lösung aufnahm, muß nothwendig stets den Wärmegrad des Düngers beträchtlich herabsetzen, gleichzeitig auch den specifischen Werth des Düngers. Indem solcher Weise der Gehalt des solchen Düngers auf beträchtliche indifferente Gewichtsmassen vertheilt wird und der praktischen Beobachtung wenig Anhalt für günstiges Urtheil gewährt, zumal die quantitative Düngerproduction selten auf das untergeordnete Streumaterial und die Streu überhaupt richtig repartirt zu werden pflegt, schätzt man auch das Kartoffelkraut als Einstreu gewöhnlich viel zu gering und versagt ihm dann die ihm gebührende Beachtung. Wenn jedoch das Kartoffelkraut dem Boden an organischen Stoffen in 95 pCt. Trockensubstanz von 23 pCt. des Gesamtgewichtes der Ernte von diesen über 19, an mineralischen an

3 pCt. entzieht und von ersteren auf den Knollenertrag in 25 pCt. Trockensubstanz und 27 pCt. des Ertrages nur 34 pCt. desselben an Mineralien noch nicht 0,8 pCt. kommen, sich also die Ertragsmenge vom Kraut zu der der Knollen wie 22 zu 35 verhält, so verdient sicher der Ertrag jenes unvollständig genügten Bodenertrages als die entsprechende Benützung desselben die sorgfältigste und ernstlichste Erwägung.

Das Ausbreiten des Kartoffelkrauts auf die Wiesen ist nicht ohne lohnenden Erfolg, wirkt aber mehr mechanisch, wie jede Ueberbedeckung des Graswuchses, als durch Abgabe von Dungkraft und verwerthet die Düngungsfähigkeit des Krauts nur zu ganz unverhältnißmäßigem Theile.

Möchten Wissenschaft und Praxis sich die dargestellte, auf den Kartoffelbau und noch weiter nachtheilig einwirkende Mißachtung des Kartoffelkrauts nicht zu Schulden kommen lassen.

Allgemeines.

Resultate der Einsammlung von Maikäfern während des Flugjahres 1868.

(Schluß.)

Die Landwirthe werden mehr und mehr einsehen, daß einer der sichersten Gewinne für die Rente in Abwendung von Culturschäden besteht. Bei der Art der Bodencultur im Vereinsbezirke aber ist der Maikäfer in seiner Larve der Hauptschädiger und es darf mit den Mitteln zur möglichsten Verringerung der Menge seines Vorkommens nicht geraselt werden.

In einer vergleichsweise ungünstigen Lage zu dieser Frage sind nun bekanntermaßen die Anwohner von Laubwaldungen. Dorthin werden durch reichliche Nahrung große Mengen von Maikäfern gelockt, während letztere dann selbstverständlich vor Allem die nächstgelegenen Culturfelder zum Ablegen der Eier aussuchen. Nun bestehen in Bezug auf das Vorkommen der Maikäfer in den Waldungen verschiedene Meinungen. Rambahste Entomologen und praktische Forstleute behaupten, daß sich die Maikäfer nur auf die Ränder der Waldungen beschränken. So sagt Rabeburg — eine Autorität für solche Fragen — „daß die Maikäfer sich in den Waldungen vorzugsweise an den Rändern zusammenziehen, wo man derselben leicht habhaft werden könne. Sei man auch nicht im Stande, alle Maikäfer zu vernichten, sondern nur die Hälfte, so wäre dies schon großer Gewinn, denn die Maikäferbrut gedeihe ja meist gewiß und die Vertilgung der Engerlinge sei mühsamer und kostspieliger“. Sicher bleibt inzwischend, daß die Vertilgung der Maikäfer in Waldungen und auf sehr hohen Bäumen ihre großen Schwierigkeiten hat. Aber es sollte das nicht abhalten, auch dort das Erreichbare zu thun, auch dort möglichst große Mengen des Insects zu vertilgen. „Was weg ist, ist weg.“ — Vielleicht lassen sich für diesen besonderen Fall noch besondere Hilfen ermitteln. Sollte sich beispielsweise immer mehr erweisen, daß der Nützungswerth der Maikäfer, sei es zur Düngung oder Fütterung oder zu anderen Zwecken, die Kosten der Einsammlung überwiegt, dann wird das Insect massenhaft auch da eingesammelt werden, wo die Einsammlung eine schwierige ist. So wird in einem der eingegangenen Berichte Folgendes mitgetheilt: „In einer süddeutschen Zeitung las ich, daß eine chemische Fabrik bei Augsburg Maikäfer ankauft und mit 1 1/2 bis 1 2/3 Thlr. pr. Ctr. bezahlt. Wenn solche Verwerthung möglich wäre, so würde uns geholfen sein! Denn der Maikäfer würde dann eine gesuchte Waare sein.“

Es sind in den Berichten über die stattgefundenen Einsammlungen manche Gegenden des Vereinsbezirks nicht vertreten und werden auch in den späteren Berichten nicht vertreten sein. Es hat dieses seinen einfachen Grund darin, daß das Vorkommen der Maikäfer im Vereinsbezirk diesmal ein fruchtloses war, daß in einzelnen Gegenden geringe, in anderen wieder ungeheure Mengen auftraten. So lautet der Bericht eines Forstmannes aus der Nähe von Gotha, also vom nördlichen Abhang des Thüringer Waldes: „Das Vorkommen ist ganz partiell. Am Thüringer Wald in den Laubholzforsten nicht ein Maikäfer, die äußeren Ränder ganz abgefressen. In größeren Obstgärten wenig, alle einzelnen Bäume ganz kahl“. Dagegen wird aus Schleusingen mitgetheilt, daß das dortige Auftreten der Maikäfer ganz unbedeutend war und daß man überhaupt das eigentliche Flugjahr für den südlichen Abhang des Thüringer Waldes erst im Jahre 1869 erwartet. Demnach sind es noch die Altmark und einige Theile der Elbkreise, von wo gemeldet wird, daß man von den Maikäfern völlig verschont geblieben sei oder nur ein sehr geringes Vorkommen beobachtet habe.

Seitens mehrerer Zuckerfabriken wird bemerkt, daß man das dort diesmal geringere Auftreten der Maikäfer der in den Vorjahren für die Vertilgung des Insects aufgewandten Thätigkeit zu verdanken glaube. Auffällig mußten im ersten Augenblick einige Vacatberichte aus Orten sein, in deren weiterer Umgebung bedeutende Massen von Maikäfern eingesammelt waren. Die Erklärung folgte aber und giebt für die Nothwendigkeit des Vogelschuges wichtige Winke. So wird von der Zuckerfabrik Nienburg (Anhalt) mitgetheilt: „In Nienburg a. S. ist von Maikäfern, Dank der wirklich immensen Massen von Krähen, weder in diesem Flugjahr, noch in den früheren Jahren nennenswerthes gespürt und waren daher Vertilgungsmittel nicht erforderlich.“ Sodann von der Zuckerfabrik Grimshausen (Anhalt): „Die Maikäfer traten in hiesiger Gegend nur in verhältnißmäßig sehr geringer Zahl auf, da eine bei Nienburg befindliche sehr bedeutende Krähen-Colonie die Vertilgung der Käfer und Engerlinge prompt besorgt.“ Ferner von der Zuckerfabrik Gänsefurth (Anhalt): „Daß auch dieses Jahr nicht mehr Maikäfer als in den anderen Jahren vorkommen, schreiben wir unseren Krähen zu, welche im hiesigen Busche gehegt werden.“ Endlich von der Zuckerfabrik Gröbzig (Anhalt): „Herr Oberamtmann Roth hier hegt eine Colonie Krähen in seinem Garten, die nach seiner Aussage wenigstens einige Wispel Maikäfer vertilgt haben.“

Uebereinstimmend wird mitgetheilt, daß die Flugzeit diesmal eine kurze war, wie sich dies denn auch erklären läßt durch die andauernd warme und überwiegend regenlose Witterung. Indessen ist das schnelle Verschwinden der Maikäfer da, wo das Einsammeln sofort energisch betrieben wurde, noch einfacher eben hierdurch zu erklären. So war beispielsweise in Halle — wo zeitig genug die dasige Zucker- und die Cichorienfabrik das Erbieten zum Ankauf veröffentlichten und wo auch der Magistrat die nöthigen Maßnahmen ergriffen hatte, so zwar, daß in Folge dessen sehr bald gegen 500 Centner angekauft waren — schon nach wenigen Tagen nur noch ein schwacher Rest von Nachzügeln zu bemerken und der Magistrat konnte in einer desfallsigen Bekanntmachung seine Befriedigung darüber ausdrücken, daß es durch diese Maßregeln u. A. gelungen war, den Bäumen und Sträuchern ihren Laubzudrud zu erhalten. (Von dem massenhaften Auftreten des Insects in und nahe Halle zeugt es, daß allein auf dem Stadtgottesacker in wenigen Tagen ca. 10 Ctr. und auf dem Friedhofe 7 Ctr. gesammelt waren.)

Von mehreren Seiten wird beklagt, daß bei dem vorzugsweise häufigen Vorkommen der Maikäfer an Waldrändern, sowie an den Pappeln von Staatschauffeern dort zu wenig für die Vertilgung geschehen sei.

Ueber den Ankaufspreis und die Art der Tödtung giebt eine Tabelle Auskunft, welche dem qu. Aufsatze beigelegt ist. Nach derselben und mit Hinzufügung eines Nachtrages sind 8195 Centner 43 Pfund (gleich 273 zweispännigen Fuhrn à 30 Ctr. oder 41 beladene Eisenbahnwagen à 200 Ctr. gesammelt und verarbeitet worden). An einigen Orten, z. B. im Kreise Weissenfels, hatte man den Versuch gemacht, die Maikäfer lebendig in Gruben zu schütten, mit 2 Fuß Erde zu bedecken und diese festzustampfen. Der Erfolg war, daß, als nach 4 Tagen die Gruben geöffnet wurden, die Maikäfer wieder auflebten. Vorzugsweise ist die (auch in dem Aufruf empfohlene) Tödtungsart durch Dampf oder siedendes Wasser angewandt; es wird von vielen Seiten ausgesprochen, daß es sich hiermit um die schnellste Tödtungsart handle. Sehr empfohlen wird sodann noch das in Sondersleben (Anhalt) angewandte Verfahren, die Maikäfer in Gruben mit eben in Lösung begriffenem Kalk zu bringen und sie mit letzterem umzurühren. Die Tödtung sei eine augenblickliche und jeder etwa noch verbleibende üble Geruch verschwinde durch Ueberwerfen mit einer Erdschicht.

Demnach giebt die Tabelle Auskunft über die Art der Verwerthung und daß überwiegend die zu Dünger stattgefunden hat. Wo Verfütterung an Schweine und Geflügel stattgefunden hatte, ist ein Nachtheil für die Thiere nicht bemerkt bis auf einen Fall, wo der Tod eines Huhns diesem Futter zugeschrieben wird. Es wurde als Regel eingehalten, die Maikäfer mit hinreichenden Zusätzen von anderen Futterstoffen (gekochten Kartoffeln u. dgl.) zu verabreichen.

Erfreulich ist, daß an mehreren Stellen, namentlich von Zuckerfabrikbesitzern, Brutstätten nach Art der von der Oberförsterei Bischofode empfohlenen angelegt wurden, so z. B. in Schwanebeck an neun verschiedenen Stellen im Felde, von der Zuckersiederei in Halle und in Buckau. Von Buckau wird berichtet, daß man schon im vorigen Jahre solche Brutstätten angelegt hatte, die im Juli voller jungen Engerlinge waren, welche dann mit dem Mist verbrannt wurden. In Halle wurde beobachtet, daß die Maikäfer in großen Mengen auf die Brutstätten zufliegen und sich dort eingruben, um ihre Eier abzulegen. Den Erfolg werden spätere Mittheilungen melden.

Demnach ist zu bemerken, daß in den Fällen, wo die eingesammelten Mengen von Maikäfern nach Wispeln, Scheffeln u. dergleichen wurden, zum Zweck des tabellarischen Nachweises die Reduction auf Gewicht vorgenommen und dabei der Scheffel Maikäfer zu 41 Pfund angenommen ist.

Wie bereits bemerkt, werden ferner eingehende Nachrichten über Einsammlungen in folgenden Heften genannter Zeitschrift nachgetragen werden.

Und schließlich noch Folgendes: Es wird, so groß die Menge des vertilgten Ungeziefers ist, auch jetzt nicht an Stimmen fehlen, welche sagen: unvergleichbar größere Mengen seien unvertilgt geblieben. Das kann in der That richtig sein, spricht aber nicht gegen das Subtractionserempel, sondern nur dafür, daß man da und dort sein eigenes Interesse nicht zu wahren verfehle. Mag man da, wo eine so kurze Mühe gespart ist, durch vier Jahre hindurch die üblen Folgen tragen, wie man da, wo energisch das Nöthige geschehen ist, sich der guten Wirkungen erfreuen wird. Sodann: der diesjährige Versuch der Anregung zur allgemeinen Abwehr und zur Organisirung derselben wird hoffentlich die Folge haben, daß in den nächsten Jahren, und namentlich im nächstkommenden Flugjahr diese Abwehr eine ganz allgemeine, möglichst ausnahmslose ist.

General-Secretariat des landw. Central-Vereins der Provinz Sachsen u.

Dr. Stadelmann.

Das Abblatten der Rüben.

Die Frage, ob das Abblatten der Rüben einen Einfluß auf die Wurzelernie hat, wurde schon oft besprochen, ohne daß sie vollständig und entschieden beantwortet worden wäre. Nach in Frankreich angestellten Versuchen hat die Ernte

1) von 3mal abgeblatteten Rüben	6,439 Kilo
2) „ 1mal „	6,870 „
3) „ nicht „	7,980 „

geliefert. Anderwärts hat man folgende Resultate erhalten:

	Blätter.	Wurzeln.
1) nicht abgeblattete Rüben gaben	7,196 und	24,709
2) 1mal „	9,890 „	22,306
3) 2mal „	12,486 „	20,100

Es wäre gut, wenn man allenthalben durch Versuche von dem Werth oder Unwerth des hin und wieder in so ausgedehnter Weise üblichen Abblattens der Rüben sich überzeugen wollte.

(Landw. Ztg. f. Th.)

Das Einlegen der Eier.

In der jetzigen Zeit, wo eine umsichtige Hausfrau schon an das Einlegen der Eier für den Winterbedarf zu denken beginnt, werden folgende Bemerkungen wohl angebracht sein.

Zunächst ist kein solches Ei mehr frisch, welches beim Schütteln inwendig mitschüttelt. Die Ursache von letzterer Erscheinung ist, daß dies Ei bereits an Albumin verloren hat. Kein Ei, selbst wenn es auch nicht mitschüttelt, wird sich aber ferner länger als höchstens vier Wochen aufbewahren lassen, wenn man es nicht gegen den Zutritt der Luft abschließt. Und auch in dem Falle, daß man die Eier, sei es durch welches Mittel immer und wäre es eine versteinende Umhüllung, vor dem Luftzutritt geschützt hat, entweicht gleichwohl doch immer nach und nach die in ihnen enthaltene wässrige Substanz. Der tiefere Grund hiervon ist der, daß jedesmal vor der Aufnahme der Eier in die Luft von ihnen abschließenden Manipulation ein Eintritt der Luft zu ihnen stattgefunden hatte, in Folge wovon diese Luft ihren Stickstoff und Kohlenstoff, woraus sie besteht, mit den inneren Bestandtheilen des einzelnen Eis verbindet und durch das daraus sich entwickelnde kohlensaure Gas eine Verwesung oder Zersetzung zu Wege bringt, indem zuerst der Eidotter davon ergriffen wird, worauf dann die Zersetzung des ganzen inneren Eis unausweichlich folgt.

Die Eier haben ihrer eigentlichen Bestimmung nach den Beruf, daß sie sich so lange halten sollen, als die Henne Zeit nöthig hat, um ihre Brut beisammenzutreiben, und es kann daher der Lebenskeim in einem Ei wohl einige Wochen hindurch erhalten bleiben, etwa höchstens 7 bis 8 Wochen, aber länger nicht. Nun kann man bekanntlich zwar ein Ei wohl 2 Jahre hindurch in conservirtem Stande forterhalten, dadurch, daß man es mit Butter, Del oder Speck einreibt, aber von dem Momente dieser Manipulation ab bis zum Ablauf dieser 2 Jahre verliert es demunerachtet von Tag zu Tag seinen Albumingehalt in Folge von der Transpiration, und während die im Innern vorhandene Kohlenensäure bis zu einer gewissen Ausdehnung daraus entweicht, wird in Folge von dem Allen das



Drill-Maschinen,

von denen seit Herbst vorigen Jahres 70 Stück verkauft wurden, prämiert in Bromberg und Neumarkt, von 4" Reiheneinstellung ab, neuester Construction, ohne Riffelscheiben, für deren Güte die besten Zeugnisse vorliegen, mit Vorrichtung zum Rüben-Dibbeln, außerdem als Hackmaschine und Furchenzieher zu benutzen, sowie **Breit-Dresch-Maschinen für Molkereibetrieb** [548] und kleinere Dreschmaschinen verschiedener Größe, liefert die **Maschinenfabrik von J. Kemna in Breslau, Kleinburgerstraße 26.**

Vorster & Grüneberg in Staßfurt

empfehlen den Herren Landwirthen ihren bewährten, durch 13 Medaillen, Ehrenpreise und Diplome ausgezeichneten [456] **Kalidünger.** London 1862. Paris 1867. Mention honorable für Aufbarmachung der Staßfurter Kalisalze. Goldene Medaille für vorzügliche Kalidünger aus Staßfurter Kalisalzen. Der angegebene Gehalt wird garantiert. Prospekte und sonstige Auskunft über Fracht, Anwendung u. werden mit größter Bereitwilligkeit ertheilt.

Die Königl. Preuss. patentirte Kali-Fabrik

Paris 1867. Classe 44 Goldene Medaille für Kali-Präparate. [455] Meß 1868. Goldene Medaille für Kalidüngemittel. **von Dr. A. Frank in Staßfurt** Paris 1867. Classe 74 Silberne Medaille für Entdeckung und Aufbarmachung der Staßfurter Kalisalze für den Ackerbau. empfiehlt zur nächsten Bestellung, sowie zur Biefendüngung ihre erprobten Kalidüngemittel und Magnesia-Präparate unter Garantie des Gehaltes. — Prospekte und Frachtangaben franco und gratis. Paris 1867. Classe 48 ehrenvolle Anerkennung einziger Preis für Kalidüngemittel.

Zur Düngung!

offerieren billigst in zuverlässigster Qualität und unter Garantie des Gehaltes:

Ia. echten Peru-Guano, roh und gemahlen; Superphosphat; feinstes gedämpftes Knochenmehl Nr. 1; rohes Knochenmehl und sämtliche Kalisalze aus der Fabrik des Herrn Dr. Frank in Staßfurt.

Schlesisches Landw. Central-Comptoir, Ring 1.

Zur Saat!

offerieren billigst: [567]

echten Johannis-Roggen; Orig.-Probsteier, Orig.-Spanischen Riesen-Stauden, Pirnaer, Seeländer und Schilf-Roggen, sowie Absaaten davon; ferner:

Orig.-Holländer-Saat-Raps, sowie Absaaten. Langen Knörich, Buchweizen, Klee- und Grassämereien.

Preis

für die Herren Pferdebesitzer.

Die sich einen Ruf erworben habende concentrirte Kolik-Diätur für Pferde wird nur allein vom Erfinder verhandelt. Im Interesse der Herren Pferdebesitzer sollte diese Diätur in keinem Stalle fehlen, indem nach Anwendung derselben stets sichere Heilung folgt. Preis 1 Flasche 1 Thlr. 6 Flaschen 5 1/2 Thlr. 12 Flaschen 10 Thlr. Gebrauchsanweisung ist beigelegt. Bestellungen werden frei mit Sendung des Betrages erbeten oder durch Postnachschuß entnommen.

R. Bast,

Thierarzt 1. Classe und Notharzt des Königl. Remonte-Depots Gummishof bei Treptow a. d. Rega in Pommern. [562]

Mähe-Maschinen

von H. & G. Kearsley aus Nipon, welche auf der hier stattgehabten Ausstellung mit zwei ersten Preisen, — einer goldenen und einer silbernen Medaille prämiert wurden, sind durch den unterzeichneten General-Agenten obiger Firma zu beziehen.

Von der **Eureka = Gras-Mähe = Maschine** von Wilber, Stevens & Co. aus

Boughtree treffen in nächster Zeit mehrere Exemplare bei mir ein und ersuche ich die Herren Reflectanten um geneigte rechtzeitige Bestellung. [523]

F. Scheer,

Berlin, Chausseest. 98.

Auf dem Ritterguthshofe

zu Mödern bei Leipzig soll Dienstag den 6. October c, Mittags 12 Uhr, der gesammte daselbst stehende, vollkommen gesunde, fehlerfreie und selten schöne Rindviehstamm,

reihgrau-weißer Amsterdamer Originalschlag, bestehend aus: [566]

3 Bullen, ca. 40 Kühen, meist hochtragend, 10 Ferkeln und 20 Kälbern, gegen sofortige Barzahlung meistbietend veräußert werden. Den verkauften Stücken wird noch 3 Tage, bis mit 9. October, freier Futterstand gewährt. Der Viehstand kann von jetzt an in Augenschein genommen werden. Drohschleuse von Leipzig bis Mödern: 1 Person 10 Mark, 2 Personen 12 Mark. 2. August 1868.

Die Wirthschafts-Verwaltung.


Wasserrübensamen

(Herbst- oder Stoppel-Rüben), lange weiße rothköpfige Schleifische a. Pfd. 7 1/2 Sgr., lange weiße rothköpfige Ulmer a. Pfd. 6 Sgr., runde weiße rothköpfige Schleifische a. Pfd. 8 Sgr., runde weiße rothköpfige Ulmer a. Pfd. 5 Sgr., engl. Herbst-Rüben a. Pfd. 12 1/2 Sgr., offerirt unter Garantie der Echtheit und Güte: [515]

J. G. Hübner,

in Bunzlau in Schl.

Ein 1/2-jähr. fruchtbarer Eber und ebenso, wenn möglich, ein 1/2-jähr. oder jüngerer Hauer der großen Yorkshirer oder großen Berkshire Race werden gesucht. Franco-Offerten Dom. Piebichau poste rest. Kaiserwaldau. [551]



Transportable Dampfmaschinen, Field'sche Röhrenkessel,

äußerst ökonomisch arbeitend, in Bromberg mit der goldenen Medaille prämiert, empfehlen: [533]

Aron & Gollnow,


Grabow a. D., Vertreter C. Kayser, Breslau, Rosenthalerstraße Nr. 1.

Marshall Sons & Co's

Locomobilen, Dreschmaschinen und verticale Dampfmaschinen

empfehle unter Garantie der Güte von meinem Lager hier. **H. Humbert, Neue Schweidnitzer-Strasse Nr. 9, Breslau.** General-Agent für Norddeutschland.

Dampf-Apparate



für Viehfütter, Preis 130 Thlr. Kessel und Bottiche aus Schmiedeeisen, für 8 Scheffel Inhalt berechnet. Andere Größen auf Bestellung.

Gleichzeitig empfehle ich: Locomobilen u. Dreschmaschinen, Göpel und Göpel-Dreschmaschinen, Futterzerkleinerungsmaschinen u., Heuwendemaschinen 90 Thlr. Eisene Sandrechen 15 Thlr. Pferderechen 65 Thlr.

Julius Goldstein,

Maschinen- und Wasserleitungs-Bau-Anstalt:

Siebenbüfener Straße Nr. 105. Filiale für Gas- und Wasserleitungen: Nr. 6 Blücherplatz. [463]

Clayton Shuttleworth & Co.

weltberühmte Locomobilen und Dreschmaschinen für Getreide-, Klee und Lupinendrusch etc.

Die besten engl. Drills von Priest & Woolnough, Mc. Cormik's selbstablegende Mähmaschinen, landwirthschaftliche Maschinen von den besten englischen Specialisten.

Moritz & Joseph Friedlaender,

[453] 13, Schweidnitzer-Stadtgraben, Breslau.

Drill-Maschinen

von Smyth & Sons - Peasenhall

in bewährtester Construction und Güte der Bauart empfehle unter Garantie in allen Reiheneinstellungen. — Adressen von Käufern von 99 dieser Maschinen in hiesiger Gegend stehen gern zu Diensten.

H. Humbert, Neue Schweidnitzer-Strasse Nr. 9, Breslau.



Hundert schwere Mast- und Zug-Ochsen sind auf dem Gute Neu-Terranova b. Elbing zum Verkauf. — Näheres bei dem Besitzer Hilgendorff daselbst.

Fein gemahlen, gedämpftes Knochenmehl, präparirtes Knochenmehl und gedämpft fein gemahlenes Hornmehl, letzteres eignet sich ganz besonders zur Biefendüngung, — offerirt [543]

Die Dampf-Knochenmehl-Fabrik in der Rüter-Vorstadt, Glogau, Comptoir: Schulstraße Nr. 23.

Depot von H. J. Morck & Co., Hamburg.

Phospho-Guano { 18 1/2 - 21 % lösliche Phosphorsäure, 3 - 4 % Stickstoff.

Estremadura-Superphosphat { 20 - 23 % lösliche Phosphorsäure, davon 18 - 21 % löslich, [494]

empfehlen in fein pulverisirter Waare: Carl Scharff & Co., Breslau, Weidenstr. 29.

Superphosphat aus Baker-Guano, sowie aus Knochenkoble (Spodium), Peru-Guano, Chilisalpeter, Staßfurter und Dr. Frank'sches Kalisalz u. ist vorrätig resp. zu beziehen durch die Comptoirs von C. Kulmiz in Bda u. Marien-Hütte bei Saarau und auf den Stationen der Breslauer-Freiburger Bahn.

Den Herren Landwirthen offerirt unter Garantie des Gehaltes: **Superphosphat** (aus Knochenkoble) 3 1/2 % Stickstoff, 16 - 18 % lösliche Phosphorsäure, Baker-Guano-Superphosphat mit 20 - 21 % lösliche Phosphorsäure, Ammonial-Superphosphat I. mit 8 % Stickstoff, 12 % lösliche Phosphorsäure, Ammonial-Superphosphat II. mit 4 % Stickstoff, 16 % lösliche Phosphorsäure, Biefendünger (Ammonial-Phosphat mit Kali) zu Fabrikpreisen. [556]

Eduard Sperling, Breslau, Friedrich-Wilhelmstr. 1.

Peru-Guano,

Baker-Guano-Superphosphat, Kali-Salze,

ff. gedämpftes Knochenmehl

empfehlen in zuverlässigster Qualität unter Garantie des Gehaltes billigst [453]

Kettler & Bartels,

vorm. Ed. Winkler, in Breslau, Ritterplatz 1.

Verantwortlicher Redacteur: W. Xante in Breslau. Druck von Graf, Barth u. Comp. (W. Friedrich) in Breslau.

Chemische Untersuchungen

all u. jeder Art werden unter garantirtester Genauigkeit billigst durch mich ausgeführt. Breslau, Paradiesstr. 24a. [553] Dr. Werner.

Unterzeichnete Fabrik empfiehlt ihre Fabrikate von feuerfestem Thon, Chamotteziegeln, Platten, Formenstücke aller Dimensionen, Chamottethon, Chamottemehl u. s. w.

Die Analysen unseres Thons, welche durch Herrn Prof. Kroker und Herrn Dr. Bretschneider ausgeführt sind, stellen denselben in die Reihe der besten, feuerfesten Thone und sind bei uns jederzeit einzusehen.

Die Gräfl. Sauerma'sche Thonwaaren- und Chamottefabrik zu Muppersdorf bei Strehlen.

„Holz-Cement-Verdachungen“

nach dem verstorbenen Erfinder „Häusler'sche Dächer“ genannt, fertigt mit langjähriger Garantie, unter Leitung eines geprüften Bautechnikers, die Holz-Cement-, Dachpappen- und Dachlad-Fabrik von F. Kleemann in Breslau,

Comptoir: Neudorferstraße 7. Fabrik: Neudorferstraße 72. Auch empfiehlt sich die Fabrik zur Ausführung von Pappbedachungen und zur Lieferung aller für genannte Dächer erforderlichen Materialien in bekannter Güte bei soliden Preisen.

Auction seltener Treibhaus-Gewächse.

Von Montag, den 7. September d. J., Vormittags 9 Uhr ab, und folgende Tage soll die Versteigerung der von Deder'schen Pflanzen-Sammlung in Berlin, Königgrätz-Straße Nr. 136, stattfinden. Die zu versteigerten Pflanzen umfassen ganz besonders die Palmen- und Orchideen-Sammlungen, unter denen viele Originalpflanzen und Exemplare von höchstem Werth befindlich sind, sowie andere seltene und schön cultivirte Pflanzen. [550] Frank, Königl. Auctions-Commissarius, Leipzigerstraße 66.

Die chemische Fabrik „Leopoldshütte“ (H. Douglas) zu Leopoldshall — Staßfurt

offerirt zur nächsten Bestellung für Raps, Getreide u., zu Wiesen- und Koppdüngung ihre bewährten, mehrfach prämierten

Kalidünger

und empfiehlt besonders ihr patentirtes, chlorfreies, hochgradiges schwefelsaures Kali, schwefelsaures Kalimagnesia und schwefelsaures Kalimagnesia in Krystallen, welche den Landwirthen vor jeder Verfälschung schützt. Aufträge, unter Garantie des Gehalts zu Fabrikpreisen ab Staßfurt auszuführen, nimmt entgegen und steht mit Proben, Preiscuranten, sowie Auskunft über Anwendung und Nutzen der einzelnen Sorten zu Dienst. [557] Eduard Sperling, Breslau, Friedrich-Wilhelmstr. 1.

Gedämpftes Knochenmehl I.,

Knochenmehl mit 25 pCt. Schwefelsäure, präparirt, ged. Knochenmehl mit 40 pCt. Peru-Guano, präp. Knochenmehl mit 40 pCt. Peru-Guano, Superphosphat mit conc. Kali-Salz, ammoniak. Superphosphat, Superphosphat I., Superphosphat II., offeriren unter Garantie des Gehaltes laut Preis-Courant: [458]

Chemische Dünger-Fabrik zu Breslau, Fabrik: An der Strehleiner Chaussee, hinter Suben.

Comptoir: Schweidnitzer-Stadtgraben Nr. 12, Ecke der Neuen Schweidnitzer-Straße.